



## วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย

- เป็นวัคซีนที่ผลิตโดยใช้เชื้อไวรัสปากและเท้าเปื่อยสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่
- เป็นวัคซีนที่มีเชื้อไวรัสปากและเท้าเปื่อยในปริมาณที่ให้ประสิทธิภาพการป้องกันโรคในระดับสูง
- เป็นวัคซีนที่มีความบริสุทธิ์สูง จึงให้ความปลอดภัย ไร้ผลข้างเคียงในการใช้
- เป็นวัคซีนที่มีทั้งชนิด 1 ไทป์ (ไทป์โอ) ชนิดรวม 2 ไทป์ (ไทป์โอ-เอ) และชนิดรวม 3 ไทป์ (ไทป์โอ-เอ-เอเชีย 1) ทั้ง 3 ชนิดเป็นวัคซีนเชื้อตายเพื่อนำมาฉีดเพื่อป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกร
- วัคซีน 1 โดส (1 ซีซี) ประกอบด้วย เชื้อไวรัสปากและเท้าเปื่อย แต่ละไทป์ อย่างน้อย 0.8 SN log<sub>10</sub>
- ฉีดครั้งละ 1 โดส (1 ซีซี) เข้ากล้ามเนื้อ




สรุปจากภาพ: วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยของเมรียลมีเชื้อไวรัสปากและเท้าเปื่อยในปริมาณ 6.0 PD<sub>50</sub> (มากกว่ามาตรฐานที่ทางยุโรปกำหนดไว้ 3.0 PD<sub>50</sub>) ซึ่งสุกรที่ฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยของเมรียลจะมีระดับภูมิคุ้มกันและความคุ้มโรคในระดับสูง




สรุปจากกราฟ: วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยของเมเรียลมีความบริสุทธิ์สูง ดังนั้นการใช้วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยของเมเรียล จึงให้ความปลอดภัยสูงและไร้ผลข้างเคียง

- โปรแกรมการฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยของเมเรียล
  - สุนัขสาวให้ฉีด 1 ครั้ง ก่อนนำเข้าฝูง



- สกรแม่พันธุ์  
แบบที่ 1 ให้ฉีดกระตุ้นที่ 2-3 สัปดาห์ ก่อนคลอดทุกครั้ง เพื่อให้ได้ภูมิคุ้มโรคที่  
ถ่ายทอดผ่านนมแม่เลี้ยงไปยังลูกสุกรสูงขึ้น




แบบที่ 2 ให้ฉีดกระตุ้นทุกๆ 6 เดือน (ทางเลือกที่ให้ใช้ร่วมกับแบบที่ 1)




- สกรพ่อพันธุ์ ให้ฉีดกระตุ้นทุกๆ 6 เดือน



- ลูกสุกรที่เกิดจากแม่ที่ได้รับวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย  
แบบที่ 1 ให้ฉีดเพียงครั้งเดียวที่อายุ 10 สัปดาห์



แบบที่ 2 ในเขตที่มีการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย หรืออยู่ในสถานะที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ  
ไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อย ให้ฉีด 2 ครั้ง โดยครั้งแรกฉีดที่อายุ 8 สัปดาห์ และครั้งที่ 2 ที่อายุ 12 สัปดาห์



- โปรแกรมการฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยของเมรียลในกรณีฉุกเฉิน
  - ในช่วงที่มีการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย หรือในสถานะที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อย ให้ฉีดวัคซีนกับสุกรทั้งฝูง รวมทั้งแม่สุกรที่กำลังตั้งท้องด้วย
- เขย่าขวดให้วัคซีนเข้ากันดีก่อนใช้
- ห้ามวัคซีนถูกแสงสว่าง และห้ามเก็บวัคซีนไว้ในที่ร้อน (อุณหภูมิเก็บรักษาวัคซีนที่เหมาะสม คือ 2-8 องศาเซลเซียส)
- ขนาดบรรจุ กล่อง 1 ขวด ขนาดขวดละ 100 โดส